

## Bijlage Erfelijke darmkanker

### Identificatie van patiënten met een hoog risico op een familiair of erfelijk colorectaal carcinoom

Doorgaans zullen patiënten met een hoog risico op familiair of erfelijk colorectaal carcinoom (CRC) geïdentificeerd worden in de tweede lijn (meestal door de MDL-arts). Bij patiënten met een hoog risico op CRC wordt periodieke controle aangeboden volgens de IKNL-richtlijnen Erfelijke darmkanker, Colorectaal carcinoom en Coloscopie surveillance. Zo wordt er bijvoorbeeld bij een erfelijke aanleg voor het lynchsyndroom aanbevolen om vanaf de leeftijd van 25 jaar een keer per twee jaar coloscopie te verrichten. Bij andere vormen van erfelijke darmkanker (FAP/AFAP/MAP) wordt surveillance geadviseerd vanaf een nog jongere leeftijd.

De huisarts kan geconfronteerd worden met vragen van een patiënt over periodieke controle of over het risico op kanker wanneer CRC in de familie voorkomt.

Het risico op CRC bij een individu zonder klachten is verhoogd als bij eerstegraads familieleden een CRC is vastgesteld op een leeftijd < 70 jaar. Indien het carcinoom op jongere leeftijd en/of bij meerdere familieleden wordt vastgesteld, neemt het risico verder toe.

De informatie in deze bijlage kan helpen om te beoordelen of nader onderzoek is geïndiceerd. Voor meer informatie zie de websites [www.huisartsengenetica.nl](http://www.huisartsengenetica.nl) en [www.oncoline.nl/erfelijke-darmkanker](http://www.oncoline.nl/erfelijke-darmkanker).

### Verwijscriteria

Deze verwijscriteria gelden voor patiënten zonder rectaal bloedverlies of andere klachten. Voor patiënten mét klachten, zie de desbetreffende standaard of richtlijn of overleg met de MDL-arts.

Verwijs patiënten  $\geq$  45 jaar voor vijfjaarlijkse coloscopie bij:

- ten minste een eerstegraads familielid met CRC < 50 jaar;
- ten minste twee eerste- of tweedegraads familieleden met CRC 50-70 jaar.

Verwijs naar een klinisch geneticus bij:

- ten minste een eerstegraads familielid met CRC of endometriumcarcinoom < 50 jaar;
- ten minste twee tweedegraads familieleden met CRC of endometriumcarcinoom < 50 jaar;
- ten minste drie eerste- en/of tweedegraads familieleden met CRC of endometriumcarcinoom < 70 jaar.
- Eerstegraads: ouders, kinderen, broers, zussen.

Tweedegraads: tantes, ooms, grootouders, kleinkinderen.

### Bron

IKNL. Landelijke richtlijn Erfelijke darmkanker, versie 2.0. Utrecht: Integraal Kankercentrum Nederland; 2015. <http://www.oncoline.nl/erfelijke-darmkanker>.