

Totstandkoming en methoden NHG-Standaard Decubitus (M70)

Behorende bij: NHG-Standaard Decubitus (M70), Versie 2.0, mei 2015

Bij de herziening van deze standaard werd een afwijkende procedure gevolgd. De NHG-Standaard Decubitus uit 1999 is primair door het NHG-Bureau herschreven op basis van de Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling. Omdat onderbouwing van een deel van de therapeutische aanbevelingen in de multidisciplinaire richtlijn vragen openliet, is in tweede instantie een search verricht naar literatuur over de effectiviteit van verbandmiddelen en andere lokaal te gebruiken middelen. Dit leverde nog enkele nieuwere overzichtsartikelen en gerandomiseerde gecontroleerde trials op.

Nadat de ontwerpstandaard gereed was, werd voor het overige de normale procedure gevolgd. De standaard werd in mei 2014 besproken in een focusgroep met zeven huisartsen, waarbij werd gelet op knelpunten in de praktijk, hetgeen nog tot een aantal wijzigingen leidde. Gelijktijdig werd de tekst voorgelegd aan diverse referenten, te weten: dr. H.J.M.G. Nelissen-Vrancken, apotheker bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); dr. E. van Leeuwen, huisarts namens Domus Medica te België (de Vlaamse huisartsenvereniging); dr. H.E.W. de Laat, verpleegkundig specialist werkzaam bij plastische chirurgie Radboudumc te Nijmegen; M.L.H.A. van Oppenraay, apotheker en redacteur van het Farmacotherapeutisch Kompas namens Zorginstituut Nederland; J.J. Oltvoort, senior beleidsmedewerker gezondheidseconomie, namens Nefarma; E.P. Poot, gezondheidswetenschapper en werkzaam bij de Werkgroep Infectie Preventie van het Leids Universitair Medisch Centrum; dr. D. Bijl, hoofdredacteur van het *Geneesmiddelenbulletin*, dr. J.A.H. Eekhof, huisarts en hoofdredacteur van *Huisarts en Wetenschap*, prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts en emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Radboudumc te Nijmegen; A.A.L.M. Rondas, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Noord en Midden Limburg; dr. R.H. Houwing, dermatoloog/SCEN-arts, werkzaam bij het Deventer Ziekenhuis. G.M.H. Kramer en M.H. Lunter, beiden huisarts, hebben namens de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS) tijdens de commentaarroude beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de vragen uit het herzieningsvoorstel. M.M. Verduijn, apotheker en senior wetenschappelijk medewerker Farmocotherapie bij de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, beoordeelde de in deze richtlijn vermelde farmacotherapie. Naar aanleiding van hun commentaren werd de tekst nog op diverse punten enigszins aangepast. Vermelding als referent wil overigens niet zeggen dat deze de tekst op elk detail onderschrijft.

In december 2014 werd de standaard voorgelegd aan de NHG-Autorisatiecommissie van het NHG die op enkele onderdelen nog nadere verheldering wenselijk achtte. Na het aanbrenge daarvan werd de standaard in januari 2015 geautoriseerd. De zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken naar de onderbouwende literatuur is te vinden bij de webversie van deze standaard. De procedures voor de ontwikkeling van de NHG-Standaarden zijn ook in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org).