

# Beslisboom hyperglykemie

## Hyperglykemie

Glucose > 15 mmol/l (Ga na of de meting correct uitgevoerd is. Zijn handen gewassen voor de meting?)

### Zeer ernstig

- Één of meer van de volgende verschijnselen:
1. Tekenen van dehydratie, zoals weinig plassen (Let op: dit uit zich pas laat door glucosurie)
  2. Braken > 4 uur
  3. Kortademigheid/hyperventilatie
  4. Soporeus of subcomateus

Braken + kortademigheid/hyperventilatie: A1-ambu (verdenking ketoacidose bij LADA)

Bij tekenen van dehydratie, braken, verwardheid of apathisch zijn: U2-visite

### Ernstig

BG > 25 mmol/l of HI op de meter of ziekteverschijnselen: braken < 4 uur, diarree en/of koorts, maar wel helder en plast nog

U3-visite (binnen 1-2 uur) adviseer alvast voldoende te drinken, indien dit niet lukt dan U2-visite

1. Adviseer voldoende te drinken, minimaal 100-200 ml per uur, liefst 500 ml in het eerste uur
2. Bijspuiten met 2-4-6 regel
3. Overweeg bij braken een anti-emeticum

Bij ernstig ziek zijn en/of dehydratie en/of als bovenstaand advies niet mogelijk is en/of als er onvoldoende bewaking thuis is

### Matig

BG 15-25 mmol/l zonder ziekteverschijnselen, maar wel dorst/polyurie

### Mild

BG 15-25 mmol/l zonder ziekteverschijnselen en zonder klachten

Adviseer voldoende te drinken (minimaal 100-200 ml per uur, liefst 500 ml in het eerste uur)

Indien BG < 15 mmol/l bereikt is: adviseer om tenminste nog 12 uur om de 2-4 uur de BG te bepalen. Laat opnieuw contact opnemen met de huisarts/HAP bij (opnieuw) braken en/of stijgende bloedglucosewaarden > 15 mmol/l

Laat patiënt opnemen in ziekenhuis voor intraveneuze behandeling